

**Recommended use:** Mucolytic enzyme helps to reduce symptoms such as pain, quantity of secretion, inability to perceive smell and stuffy nose from ear, nose and throat infections. Helps reduce (relieve) postoperative cheek swelling and/or pain after dental surgery.

**Medicinal ingredients:** Each capsule contains:

Pancreatin (sus scrofa)* .....	150 mg
Trypsin .....30,000 USP unit	Amylase .....22,500 USP unit
Protease .....22,500 USP unit	Chymotrypsin .....7,500 USP unit
Lipase .....1,800 USP unit	
Papain (carica papaya, fruit) .....	60 mg ..... 360 FCC PU
Peptizyme SP® [Serratiopeptidase/Serrapeptase, Serratia marcescens (Strain E-15)] .....	50 mg ..... 5,000 USP
Fruit Bromelain (Ananas comosus var. comosus-fruit) .....	45 mg ..... 810 FCC PU
Serratiopeptidase/Serrapeptase [Serratia marcescens (Strain E-15)].....	35 mg ..... 350 USP

\*Enteric coated



Only available from health care practitioners. Seulement disponible via un professionnel de la santé.



# Clearizyme

Proteolytic Enzyme  
Enzyme protéolytique

180 CAPSULES/  
GÉLULES



NPN 80038575

Peel here for more information.  
Tirer ici pour plus de renseignement.



**Non-medicinal ingredients:** Maltodextrin, magnesium stearate, gelatin (capsule).

**Recommended dose (adults):** Take 1 capsule with food up to 4 times a day. For individuals who experience difficulties swallowing capsules, the capsules may be opened and the granules (mini) microspheres may be mixed with soft food or fluid. Use immediately after mixing. Use the smallest effective dose which controls symptoms.

**Recommended duration of use:** For occasional use only. Consult a health care practitioner for use beyond 7 days.

**Usage :** L'enzyme mucolytique aide à réduire les symptômes tels que la douleur, les sécrétions, la perte de l'odorat et le nez bouché qui sont associés à une infection des oreilles, du nez ou de la gorge. Il aide à diminuer (soulager) le gonflement de la joue et/ou la douleur à la suite d'une chirurgie dentaire.

Distributed by/Distribué par:

Biomed International Products Corp.  
102 - 3738 North Fraser Way, L:  
Burnaby, BC, V5J 5G7 Canada  
1-800-665-8308 | biomedicine.com Exp:

**Caution/warnings:** If symptoms persist or worsen, discontinue use and consult a health care practitioner. Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, if you need extra folate, are taking antibiotics, are having surgery, if you have allergy to latex or fruits (such as avocado, banana, chestnut, passion fruit, fig, melon, mango, kiwi, pineapple, peach, and tomato). Consult a health care practitioner prior to use if you have diabetes, pancreatitis, pancreatic exocrine insufficiency or cystic fibrosis. If you have persistent swelling, have or will be undergoing major surgery or have had major trauma, consult a health care practitioner. Nausea, vomiting, and diarrhoea, abdominal pain/epigastric pain and/or heartburn have been known to occur; in which case discontinue use. Stop use and consult a health care practitioner immediately if the following symptoms appear: dizziness, headaches, difficulty breathing, rash, hypersensitivity and severe allergy. Hypersensitivity/allergy has been known to occur; in which case, discontinue use. If symptoms persist or worsen, discontinue use and consult a health care practitioner.

**Contraindications:** If you are sensitive to pancreatic enzymes or pork proteins, do not use this product. Do not use if you have heart or blood vessel problems, high blood pressure, kidney or liver disorder, bleeding disorder, haemorrhoids, gastrointestinal ulcers/lesions, or if you are taking any blood thinning agents (i.e. warfarin) or anti-inflammatory agents (i.e. acetylsalicylic acid).

Keep in a cool dry place away from sunlight. Keep out of reach of children. Safety sealed for your protection.

**Ingrédients médicinaux :** Chaque capsule contient :

Pancréatine [sus scrofa]* .....	150 mg
Trypsin ..... 30 000 USP unit	Amylase .....22 500 USP unit
Protease .....22 500 USP unit	Chymotrypsin ..... 7 500 USP unit
Lipase ..... 1 800 USP unit	
Papain (Carica papaya, fruit) .....	60 mg ..... 360 FCC PU
Peptizyme SP® [Serratiopeptidase/Serrapeptase, Serratia marcescens (Strain E-15)] .....	50 mg ..... 5 000 USP
Fruit Bromelain (Ananas comosus var. comosus-fruit) .....	45 mg ..... 810 FCC PU
Serratiopeptidase/Serrapeptase [Serratia marcescens (Souche E-15)].....	35 mg ..... 350 USP

\*Enrobage entérique

**Ingrédients non-médicinaux :** Maltodextrine, stéarate de magnésium, gélatine (capsule).

**Mise en garde :** Si les symptômes persistent ou s'intensifient, cessez d'utiliser le produit et consultez un professionnel de la santé. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous avez besoin d'un supplément de folate, si vous prenez des antibiotiques, si vous avez subi une intervention chirurgicale, si vous êtes allergique au latex ou aux fruits (comme l'avocat, la banane, le marron, le fruit de la Passion, la figue, le melon, la mangue, le kiwi, l'ananas, la pêche et la tomate), veuillez consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit. Vous devez aussi consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit si vous souffrez de diabète, de pancréatite, d'insuffisance pancréatique exocrine ou de fibrose kystique. Si l'enflure ne diminue pas, si vous avez subi ou subirez une intervention chirurgicale importante ou si vous avez subi un traumatisme important, consultez un professionnel de la santé. De la

nausée, des vomissements et de la diarrhée, des douleurs abdominales/épigastriques et/ou des brûlements d'estomac peuvent se produire. Dans de tels cas, cessez d'utiliser le produit. Si l'un des symptômes suivants apparaît, cessez d'utiliser le produit et consultez immédiatement un professionnel de la santé : étourdissements, maux de tête, respiration difficile, éruption cutanée, hypersensibilité et allergie grave. De l'hypersensibilité et des allergies peuvent se produire. Dans de tels cas, cessez d'utiliser le produit. Si les symptômes persistent ou s'intensifient, cessez d'utiliser le produit et consultez un professionnel de la santé.

**Contre-indications :** N'utilisez pas ce produit si vous avez une intolérance aux enzymes pancréatiques ou aux protéines de porc, si vous souffrez de troubles cardiaques ou des vaisseaux sanguins, d'hypertension artérielle, d'une maladie des reins ou du foie, d'un trouble de saignement, d'hémorroïdes, d'ulcères ou de lésions gastro-intestinales ou si vous prenez des anticoagulants (warfarine) ou des anti-inflammatoires (acide acétylsalicylique).

**Posologie (adultes) :** Prendre 1 capsule par jour avec de la nourriture, jusqu'à un maximum de 4 capsules par jour. Pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler les capsules, les capsules peuvent être ouvertes et les granules et microparticules peuvent être mélangées à des aliments mous ou à un liquide. Utiliser immédiatement après les avoir mélangées. Utiliser la dose minimale efficace pour soulager les symptômes.

**Durée d'utilisation recommandée :** Utilisez ce produit à l'occasion seulement. Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit au-delà de 7 jours.

Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil. Gardez hors de la portée des enfants. Scellé pour votre sécurité.