

Recommended Use: Triphala is traditionally used in Ayurvedic Medicine for the relief of occasional constipation (laxative).

Medicinal Ingredients: Each vegetarian capsule contains/	Ingrédients médicinaux : Chaque gélule végétale contient:
Oat (<i>Avena sativa</i> , seeds) 150 mg	Avoine (<i>Avena sativa</i> , graines)
Flax (<i>Linum usitatissimum</i> , seeds) 150 mg	Lin (<i>Linum usitatissimum</i> , graines)
Borage (<i>Borago officinalis</i> , seed oil) 75 mg	Bourrache (<i>Borago officinalis</i> , huile de graines)
Glucosaminane (<i>Amorphophallus konjac</i> , roots) 50 mg	Glucosaminane (<i>Amorphophallus konjac</i> , racines)
Bibhitaki (<i>Beleric myrobalan</i> , fruit) 50 mg	Bibhitaki (<i>myrobalan bellirique</i> , fruit)
Haritaki (<i>Chebulic myrobalan</i> , fruit) 50 mg	Haritaki (<i>myrobalan chébule</i> , fruit)
Amla (<i>Embllica officinalis</i> , fruit) 50 mg	Amla (<i>Embllica officinalis</i> , fruit)
Plum (<i>Prunus domestica</i> , fruit) 30 mg	Prune (<i>Prunus domestica</i> , fruit)
Marshmallow (<i>Althaea officinalis</i> , roots) 25 mg	Guimauve (<i>Althaea officinalis</i> , racines)
Fenugreek (<i>Trigonella foenum-graecum</i> , seeds) 25 mg	Fenugrec (<i>Trigonella foenum-graecum</i> , graines)
Slippery elm (<i>Ulmus rubra</i> , bark) 25 mg	Orme rouge (<i>Ulmus rubra</i> , écorce)
Papain (<i>Carica papaya</i> , fruit) 5 mg (10,000 FCC PU) / 110 000 FCC PU	Papaine (<i>Carica papaya</i> , fruit)

Non-medicinal Ingredients: Magnesium stearate, microcrystalline cellulose, silicone dioxide, hydroxypropyl methylcellulose.

Recommended Dose (Adults): Take 6 capsules with at least 8 oz. (240 ml) of water or other fluids 2 times per day.

Do not take before bedtime. Taking this product with insufficient liquid may result in choking and/or blockage of the throat, esophagus or intestine. Take with food/meal 2 hours before or after taking other medications or natural health products. Allow at least 6 to 12 hours for laxative effect to occur.

Recommended Duration of Use: For occasional use only. Consult a healthcare practitioner for use beyond 7 days.

Caution/Warnings: If you are pregnant or breastfeeding, consult a healthcare practitioner prior to use. If you have diabetes, a gastrointestinal lesion/ulcer, are taking an anticoagulant/blood thinner or an anti-inflammatory, or are having surgery, consult a healthcare practitioner prior to use. If you have symptoms such as abdominal pain, nausea, fever or vomiting, allergy to latex or fruits (such as avocado, banana, chestnut, passion fruit, fig, melon, mango, kiwi, pineapple, peach and tomato) consult a healthcare practitioner prior to use. If symptoms persist or worsen, consult a healthcare practitioner.

Contraindications: Do not use if you have difficulty swallowing.

Known Adverse Reactions: If you experience abdominal pain/discomfort, cramps, flatulence, spasms and/or diarrhoea/loose stools while using this product, reduce dose or discontinue use. If you experience chest pain, vomiting, or difficulty swallowing or breathing after taking the product, seek immediate medical attention. Stop use if hypersensitivity/allergy occurs.

Keep at room temperature in a dry, dark place. Keep out of reach of children. Safety sealed for your protection.

Available from healthcare professionals.

Disponible auprès des professionnels de la santé.



BIOMED™

Colon Cleanse

Bowel Cleansing Support Soutien au nettoyage intestinal

120 CAPSULES/
GÉLULES



NPN 80092906

Usage recommandé : Le Triphala est traditionnellement utilisé en médecine ayurvédique pour soulager la constipation occasionnelle (laxatif).

Ingrédients non-médicinaux : stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, dioxyde de silicium, hypromellose.

Posologie (adultes) : Prendre 7 comprimés avec au moins 240 ml (8 oz) d'eau ou d'autres liquides, 2 fois par jour.

Ne pas prendre avant le coucher. La prise de ce produit avec insuffisamment d'eau peut causer l'étouffement ou des blocages de la gorge, de l'œsophage ou des intestins. Prendre avec de la nourriture, 2 heures avant ou après d'autres médicaments ou produits de santé naturels. Attendre au moins 6 à 12 heures pour que l'effet laxatif se manifeste.

Durée d'utilisation recommandée : Pour un usage occasionnel seulement. Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation qui excède 7 jours.

Mises en garde : Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consulter un professionnel de la santé avant usage. Si vous souffrez de diabète, avez des lésions/ulcères gastro-intestinaux, prenez des anticoagulants ou des médicaments anti-inflammatoires, ou vous avez une intervention chirurgicale planifiée, consultez un professionnel de la santé avant usage. Si vous présentez des symptômes tels que des douleurs abdominales, des nausées, de la fièvre ou des vomissements, ou si vous souffrez d'allergies au latex ou aux fruits (tels que les avocats, bananes, châtaignes, fruits de la passion, figes, melons, mangues, kiwis, ananas, pêches ou tomates), consultez un professionnel de la santé avant usage. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un professionnel de la santé.

Contre-indications : Ne pas utiliser si vous avez de la difficulté à avaler.

Effets secondaires connus : Si vous souffrez de douleurs/inconforts abdominaux, de crampes, de flatulences, de spasmes ou de diarrhée/selles molles en utilisant le produit, réduisez la dose ou cessez-en l'utilisation. Si vous souffrez de douleurs à la poitrine, de vomissements ou de difficulté à avaler ou respirer en utilisant le produit, consultez un médecin immédiatement. Cessez l'utilisation si une hypersensibilité/allergie se manifeste.

Conserver à température ambiante dans un endroit sombre et sec. Garder hors de la portée des enfants. Sceau de sécurité pour votre protection.

Distributed by/Distribué par:

Biomed International Products Corp.

102-3738 North Fraser Way,
Burnaby, BC, V5J 5G7 Canada

1-800-665-8308 | biomedicine.com

L:

Exp:

