

Recommended use: Digestive aid.

Medicinal ingredients: Each vegetarian capsule contains:

Alpha Amylase (<i>Aspergillus flavus var. oryzae</i>).....	231 mg	23,100 FCC DU
Fungal protease (<i>Aspergillus flavus var. oryzae</i>).....	155 mg	77,500 FCC HUT
Invertase (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>).....	50 mg	1,000 FCC INVU
HemiSeb® Blend contains:			
Xylanase (<i>Trichoderma reesei</i>).....	10 mg	100 FCC XU
Beta- Glucanase (<i>Trichoderma reesei</i>) ..	10 mg	35 FCC BGU
Pectinase (<i>Aspergillus niger</i>).....	10 mg	10 Endo-PG
Phytase (<i>Aspergillus niger</i>).....	10 mg	10 FCC FTU
Lipase (<i>Aspergillus niger</i>).....	30.1 mg	3,010 FCC LU
Glucosylase (<i>Rhizopus oryzae</i>).....	30 mg	30 FCC AGU
Alpha galactosidase (<i>Aspergillus niger</i>).....	20 mg	200 FCC GalU
Diastase (<i>Aspergillus oryzae</i>).....	13.33 mg	2,000 FCC DP
Lactase (<i>Aspergillus flavus var. oryzae</i>).....	10 mg	1,000 FCC ALU
Cellulase (<i>Trichoderma reesei</i>).....	4 mg	400 FCC CU
Pectinase (<i>Aspergillus niger</i>).....	1 mg	25 Endo-PG



Only available from
health care practitioners.
Seulement disponible
via un professionnel de
la santé.



Digestizyme

High Potency Enzymes
Enzymes haute puissance



NPN 80034262

Peel here for more information.
Tirer ici pour plus de renseignements.



Usage: Aide à la digestion.

Ingrédients médicinaux: Chaque gélule végétale contient:

Alpha Amylase (<i>Aspergillus flavus var. oryzae</i>).....	231 mg	23 100 FCC DU
Protéase fongique (<i>Aspergillus flavus var. oryzae</i>).....	155 mg	77 500 FCC HUT
Invertase (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>).....	50 mg	1 000 FCC INVU
HemiSeb® mélange contient:			
Xylanase (<i>Trichoderma reesei</i>).....	10 mg	100 FCC XU
Beta- Glucanase (<i>Trichoderma reesei</i>) ..	10 mg	35 FCC BGU
Pectinase (<i>Aspergillus niger</i>).....	10 mg	10 Endo-PG
Phytase (<i>Aspergillus niger</i>).....	10 mg	10 FCC FTU
Lipase (<i>Aspergillus niger</i>).....	30.1 mg	3 010 FCC LU
Glucosylase (<i>Rhizopus oryzae</i>).....	30 mg	30 FCC AGU
Alpha galactosidase (<i>Aspergillus niger</i>).....	20 mg	200 FCC GalU
Diastase (<i>Aspergillus oryzae</i>).....	13.33 mg	2 000 FCC DP
Lactase (<i>Aspergillus flavus var. oryzae</i>).....	10 mg	1 000 FCC ALU
Cellulase (<i>Trichoderma reesei</i>).....	4 mg	400 FCC CU
Pectinase (<i>Aspergillus niger</i>).....	1 mg	25 Endo-PG

Distributed by/Distribué par:

Biomed International Products Corp.
102 - 3738 North Fraser Way, L:
Burnaby, BC, V5J 5G7 Canada
1-800-665-8308 | biomedicine.com Exp:

Non-medicinal ingredients: Magnesium stearate, hydroxypropyl methylcellulose (vegetarian capsule shell)

Recommended dose (adults): Take one capsule three times daily with food, or as directed by a health care practitioner.

Recommended duration of use: For prolonged use, consult a health care practitioner.

Caution/warnings: Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding, taking anti-inflammatory or other enzyme products, if you have diabetes or galactosemia, gastrointestinal lesions/ulcers, are taking anticoagulant agents, or are having surgery. Headaches, heartburn, bloating and hypersensitivity (e.g. allergy) have been known to occur; in which case, discontinue use.

Contraindications: Do not use if allergic to *Aspergillus* or other molds. Safety sealed for your protection. Keep at room temperature in a dry, dark place. Keep out of reach of children. Do not use if safety seal is broken or missing.

Ingrédients non-médicinaux : Stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose (enveloppe de la capsule végétale).

Posologie (adults) : Prendre une capsule trois fois par jour avec de la nourriture, ou comme dirigé par un praticien de soins de santé.

Durée d'utilisation recommandée : Pour un usage prolongé, consulter un praticien de soins de santé.

Mise en garde : Consulter un praticien de soins de santé avant d'utiliser si vous êtes enceinte ou allaitant, de prendre des produits enzymatiques anti-inflammatoires ou d'autres, si vous souffrez de diabète ou de la galactosémie, gastro-intestinaux lésions / ulcères, prennent des anticoagulants, ou ont de la chirurgie. Maux de tête, brûlures d'estomac, des ballonnements et une hypersensibilité (eg une allergie) ont été connus de se produire; dans ce cas, cesser l'utilisation.

Bouchon scellé pour votre protection. Conserver dans un endroit sec et sombre et à une température ambiante. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant.