

Recommended Use: Used in Herbal Medicine to help relieve restlessness and/or nervousness.

Medicinal Ingredients: Each vegetarian capsule contains:
St. John's wort (*Hypericum perforatum*) 4:1 QCE 240 mg; 0.3% Hypericins, 3% Hyperforin; aerial parts with flowers) 60 mg
California poppy (*Echscholzia californica*; aerial part) 40 mg
Hollowroot (*Corydalis cava*, root) 40 mg
Passion flower (*Passiflora incarnata*; 5:1 QCE 160 mg; flower) 32 mg
Valerian (*Valeriana officinalis*; 4:1 QCE 112 mg; root) 28 mg

Non-medicinal Ingredients: Microcrystalline cellulose, magnesium stearate, hydroxypropyl methylcellulose (capsule shell).

Recommended Dose (adults): Take two capsules three times a day or as directed by a health care practitioner.

Recommended Duration of Use: Consult a health care practitioner for use beyond duration of 8 weeks.

Usage: Utilisé en phytothérapie pour soulager l'agitation et/ou la nervosité.



1054
Only available
from health care
professionals.
Seulement disponible
via un professionnel de
la santé.

Neuraplex

Nervous & Restless Nerveux et agité

100 CAPSULES/
GÉLULES



NPN 80029325



Peel here for more information.
Tirer ici pour plus de renseignement.



Ingédients médicinaux: Chaque gélule végétale contient:
Millepertuis commun (*Hypericum perforatum*) 4:1 QCE 240 mg;
0.3% hypericines, 3% hyperforine; parties
aériennes avec des fleurs 60 mg
Pavot de la Californie (*Echscholzia
californica*, partie aérienne) 40 mg
Corydalis (*Corydalis cava*, racine) 40 mg
Passiflore (*Passiflora incarnata*, 5:1 QBE 160 mg; fleur) 32 mg
Centranthe (*Valeriana officinalis*; 4:1 QBE 112 mg; racine) 28 mg

Ingédients non-médicinaux: Cellulose microcristalline,
stéarate de magnésium, hydroxypropyl-méthylcellulose (coquille
de la capsule).

Posologie (adultes): Prendre deux gélules trois fois par jour
selon les indications d'un professionnel de la santé.

Durée d'utilisation recommandée: Consulter un praticien de
soins de santé pour l'usage au-delà de 8 semaines.

Distributed by/Distribué par:

Biomed International Products Corp. L:
102 - 3738 North Fraser Way,
Burnaby, BC, V5J 5G7 Canada
1-800-665-8308 | biomedicine.com

Exp:

Caution/warnings: Consult a health care practitioner if you take sedatives, MAO, contraceptives, HIV-1 protease inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, immunosuppressants, anticoagulant, digoxin, theophylline, serotonergic antidepressants, migraine therapies, SSRIs and/or anti-epilepsy drugs, anti-anxiety, seizure medications, antihistamines, bronchodilators, muscle relaxant and/or opiates. Consult a health care practitioner if you experience sleep disturbances, severe drowsiness and/or withdrawal symptoms upon abrupt discontinuation following chronic use. Consult a health care practitioner if sleeplessness persists continuously for more than 3 weeks (chronic insomnia).

Consult a health care practitioner if symptoms persist or worsen. Hypersensitivity, such as an allergy, has been known to occur; in which case, discontinue use. Some people may experience mild gastrointestinal disturbance, nausea, restlessness and/or headaches. Some people may experience drowsiness. Exercise caution if operating heavy machinery, driving a motor vehicle or involved in activities requiring mental alertness within two hours of consumption. Avoid prolonged exposure to sunlight, ultraviolet light (UV) or UV Therapy. Consumption with alcohol, other medications or natural health products with sedative properties is not recommended.

Contra-indications: Do not use if pregnant or breast feeding. Do not use in individuals with known or suspected sensitivity to the listed ingredients. Do not use if you are taking anti-cancer medications, blood thinners, antidepressant medications (e.g. selective serotonin re-uptake inhibitors, anti-HIV agent, cardiovascular medication, immunosuppressant, and/or contraceptive medications).

Keep at room temperature in a dry, dark place. Keep out of reach of children. Safety sealed for your protection. Do not use if seal is broken or missing.

Mise en garde: Consulter un professionnel de la santé si vous prenez des sédatifs, des IMAO, des contraceptifs, des inhibiteurs de la protéase du VIH-1, des inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidiques, des immunosuppresseurs, un anticoagulant, de la digoxine, de la

théophylline, des antidépresseurs sérotoninergiques, des thérapies anti-migraineuses, des ISRS et/ou des anti-épileptiques, un anxiolytique, des médicaments anti-crise, des antihistaminiques, des bronchodilatateurs, des myorelaxants et/ou des opiacés. Consulter un professionnel de la santé si vous avez des troubles du sommeil, une grave somnolence et/ou des symptômes de sevrage lors de l'interruption soudaine du traitement à la suite de son utilisation chronique. Consulter un professionnel de la santé si votre insomnie persiste continuellement pendant plus de trois semaines (insomnie chronique).

Consulter un professionnel de la santé si vos symptômes persistent ou s'aggravent.

L'hypersensibilité, comme une allergie, a été observée, auquel cas vous devez cesser d'utiliser le médicament. Certaines personnes peuvent avoir des troubles gastro-intestinaux, des nausées, être agitées et/ou avoir des maux de tête. Certaines personnes peuvent se sentir somnolentes. Faire preuve de prudence en cas d'utilisation de machines lourdes, de conduite d'un véhicule ou de participation à des activités exigeant une bonne capacité de réaction mentale dans les deux heures suivant la consommation. Éviter de s'exposer à la lumière du soleil, à la lumière ultraviolette (UV) ou à un traitement UV pendant de longues périodes. Il est déconseillé de consommer de l'alcool ou de prendre d'autres médicaments ou produits de santé naturels aux propriétés sédatives en même temps que le produit.

Contre-indications: Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous êtes allaitée. Ne pas utiliser chez les individus ayant sensibilité connue ou soupçonnée aux ingrédients cités. Ne pas utiliser ce produit si vous prenez des médicaments anti-cancéreux, des anticoagulants, des antidépresseurs (par exemple, des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine sélectifs, un agent anti-VIH, des médicaments cardiovasculaires, un immunosuppresseur et/ou des contraceptifs).

Conserver à température ambiante dans un endroit sec et sombre. Garder hors de la portée des enfants. Sceau de sécurité pour votre protection. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant.